

코로나19(COVID-19) 감염병 예방 및 헌혈자 안전대책

I 추진배경

- 코로나19(COVID-19) 감염증 확산에 따라 단체헌혈이 취소되고 유동인구 감소 등으로 안정적인 혈액수급에 어려움이 발생되어 헌혈자에 대한 안전대책수립으로 단체헌혈에 대한 신뢰구축이 필요함

II 안전대책 수립근거

- 신종 코로나19(COVID-19) 감염병 확산방지를 위한 공공기관 복무관리지침
- 신종 코로나19(COVID-19) 혈액관리본부 대응/대비 계획
 - ※ 코로나19 신속 대응을 통한 대한적십자사 “국가기반시설 혈액공급기능” 정상화

III 채혈현장 안전대책

- 헌혈자 유의사항 안내
 1. 헌혈장소 입구 「코로나19 감염병예방 안내문」 부착
 2. 헌혈자용 손세정제 및 체온계 비치
 3. 코로나의심 또는 법정전염병 관련 「혈액사용보류요청」 안내
 4. 최근 1개월 이내 외국 여행자 여행지역 및 관련증상 확인 철저

※ 외국 여행자는 지역별로 최소 1개월 이상 헌혈불가

□ 직원 위생 및 방역조치 강화

1. 전체직원 코로나19(COVID-19) 감염병 확산방지를 위한 예방교육 실시
2. 개인 위생관리

- 간호사, 혈액운송 및 단체채혈 현장 직원
 - 의약외품 마스크 이상 : 보건용마스크(KF80, 94, 99) 외 비말차단용
- 1일 2회(출근시, 오후 일과 시작전) 체온체크, 손세정제 비치 사용

3. 채혈현장 위생관리

- 간호사 및 혈액공급 인력 PCR검사 전원 “음성” 판정
- 헌혈버스 8대 대청소 및 전문업체 방역소독(매월 1회이상)
 - 로제방역(주), 알펫SS 에탄올 95% 희석액
- 1일 방역소독대장 유지(“이소프로필알콜”), 손세정제 비치
- 업무개시 전후, 채혈침대, 혈압계, 체온계, 책상, 의자 등 헌혈자 주요 접촉 부분 소독
- 헌혈자 휴식 시 띄어 앉기, 개별급식(개별음료, 과자 등) 개인용으로 전환

IV 헌혈자 안전대책

- 헌혈지원자 밀집 예방
 - 헌혈버스 내 좌석 배치 간격 조절(띄어 앉기, 최소인원 유지)
 - 헌혈시간대 구분하여 대기 및 헌혈인원 5~6명 이내로 통제
- 헌혈버스 내 마스크 필수 착용(※ 미착용자의 경우, 덴탈마스크 무상제공)
- 헌혈자 체온측정, 손세정에 의한 손소독 실시
- 출입제한 안내문 부착(제한 및 위험지역 방문자 출입제한 등)
- 헌혈 후 유증상자, 의사환자, 확진환자 및 확진환자 접촉자로 확인된 경우, 혈액 원으로 연락하도록 안내

V 「헌혈=생명나눔」 실천

□ 헌혈 프로세스



□ 헌혈전 문진항목(요약)

1. 헌혈자 건강상태 확인

- 가. 헌혈자 발열 여부 / 해외여행 이력
- 나. 헌혈전 식사여부
- 다. 수면시간(최소 4시간 이상 숙면)
- 라. 문신, 피어싱 여부
- 마. 말라리아 전혈채혈 제한지역(과주, 연천, 강화) 숙박 여부
- 바. 건강검진 중 내시경 검사자(※ 1개월 경과 후에 헌혈가능)

2. 약물복용에 의한 헌혈금지

- 가. 치료목적으로 약물을 복용한 경우
- 나. 헌혈 금지약물 복용 후 일정기간이 경과되지 않은 경우. 단, 감기약은 현재 증상이 없고 당일 복용이 아니면 헌혈 가능하나 병원에서 처방 받은 감기약 또는 항생제를 복용한 경우에는 3일간 헌혈 제한됨.
 - ※ 단, 비타민, 미네랄제제, 단순 보약성 한약 등 건강보조식품은 헌혈 가능
- 다. 기형을 일으킬 위험이 있는 약물복용의 경우
 - 건선치료제(영구 또는 3년), 탈모치료제(4주), 여드름치료제(4주) 등
- 라. 예방접종의 경우
 - 인플루엔자, A형간염, 파상풍, 자궁경부암백신, 장티푸스 등(24시간)
 - 황열, 경구용 소아마비, 경구용 장티푸스, B형 간염(2주) 등